Все синтезированные соединения Па—м имеют весьма характерные спектральные характеристики.

ИК спектры соединений Па—м содержат полосы поглощения в области 1805...1800 см^{-1} , соответствующие колебаниям группы $\text{C}=\text{O}$ β,γ -ненасыщенных лактонов, валентные колебания ν_{CH} бензольного цикла в области 3080...3060 см^{-1} — для соединений Па—ж, и фуранового кольца в области 3130...3110 см^{-1} — для соединений Пз—м.

В спектрах ЯМР ^1H 3-арилидензамещенных 3Н-фуран-2-онов сигналы алкильных групп в положении 5 цикла находятся в области 0,92...2,39 м. д. Винильный протон при С-4 образует синглет в области 6,00...6,40 м. д. Положение сигнала протона при экзоциклическом sp^2 -углеродном атоме (7,00...7,21 м. д.) определяется влиянием арильного заместителя, наличие электроноакцепторного заместителя в бензольном кольце сдвигает сигнал в более слабое поле (табл. 1).

Отнесение сигналов в спектре ЯМР ^{13}C соединений Пв было сделано на основании сравнения с известными данными, а также использованием метода off-резонанса. Число, положение и мультиплетность сигналов соответствуют предложенной структуре. Сигнал карбонильной группы наблюдается в слабом поле при 162,61 м. д. Сигналы атомов С(3), С(4) и С(5) проявляются соответственно при 121,88, 100,85 и 133,39 м. д., причем в спектре off-резонанса сигнал атома С(4) расщепляется в дублет, а сигналы четвертичных атомов С(3) и С(5) остаются синглетами. Экзоциклический sp^2 -гибридизованный атом С характеризуется резонансом при 133,70 м. д. (дублет в спектре off-резонанса). Углеродные атомы бензольного кольца поглощают при 134,61, 128,59, 128,8 и 128,02 м. д., а атомы алкильного заместителя — в области 30,37...12,31 м. д.

Однако этих данных недостаточно для определения конфигурации соединений Па—м, которые могут существовать либо в *Z*-, либо в *E*-конфигурации.

Таблица 1

Спектры ЯМР ^1H 5-*R*-3-арилиден-3Н-фуран-2-онов (II)

Соединение	Химические сдвиги, δ , м. д.			
	4-Н	=CH—Ar	Ar	R
Пв	6,20	6,90	7,25...7,65	0,92...2,10
Пг	6,40	6,95	7,25...7,70	0,92...2,20
Пд	6,40	7,23	7,28...7,80	0,87...2,40
Пж	6,35	7,21	7,22...7,76	0,87...2,20
Пз	6,00	7,20	7,25...7,30	0,97...2,00
Пи	6,10	7,22	7,25...7,35	0,92...2,10
Пк	6,10	7,20	7,25...7,35	0,87...2,20

зировано в конформации «ванна». В этом случае атомы водорода Н(3) и Н(2) находятся в заслоненной конформации. На основании изучения констант спин-спинового взаимодействия сигнал 2,72 м. д. можно приписать атому Н(2) ($J_{23} = 13$ Гц), а сигнал 2,91 м. д. — атому Н(4) ($J_{34} = 5$ Гц). КССВ протонов Н(4) и Н(3) (5 Гц) показывает, что атом Н(4) в соединениях V ориентирован псевдоаксиально.

Строение аддукта и стереоспецифичность данной реакции позволяют сделать заключение о строении исходных 3-арилидензамещенных 3Н-фуран-2-онов Па—м.

Таким образом, учитывая аксиальное расположение фенильного заместителя в соединениях Va—в,з, а также указанные выше правила, можно однозначно заключить, что используемые в реакции Дильса—Альдера 5-алкил(арил)-3-арилиден-3Н-фуран-2-оны имеют *E*-конфигурацию.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИК спектры снимали на приборе ИКС-29, спектры ЯМР записаны на приборе Varian FT-80A (рабочая частота 80 МГц, растворитель $CDCl_3$), химические сдвиги приведены в шкале δ , внутренний стандарт ТМС. Выходы и характеристики полученных соединений представлены табл. 3.

5-Алкил(арил)-3-арилиден-3Н-фуран-2-оны (Пд,е,ж,л,м) получены по методике [4].

Т а б л и ц а 3

Характеристики соединений Пд—ж,л,м* и соединений Va—г

Соединение	Брутто-формула	Найдено, % Вычислено, %				$T_{пл}$, °C	Выход, %
		C	H	N	Cl		
Пд	C ₁₄ H ₁₃ ClO ₂	67,89	5,89	—	14,67	104...105	62
		67,61	5,23	—	14,28		
Пе	C ₁₄ H ₁₃ NO ₄	65,02	5,36	5,58	—	127...129	55
		64,92	5,06	5,41	—		
Пж	C ₁₇ H ₂₁ NO ₂	78,33	7,94	5,42	—	109...110	68
		78,23	8,11	5,97	—		
Пл	C ₁₃ H ₁₃ NO ₅	59,72	5,10	5,68	—	114...115	45
		59,31	4,94	5,32	—		
Пм	C ₁₃ H ₁₃ IO ₃	45,71	3,92	5,68	—	120...121	51
		45,35	3,78	5,32	—		
Va	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	68,02	4,53	—	—	85...86	82
		67,66	4,26	—	—		
Vб	C ₂₁ H ₁₄ O ₅	72,95	4,12	—	—	102...103	87
		72,80	4,05	—	—		
Vв	C ₁₈ H ₁₆ O ₅	69,50	5,24	—	—	107...109	80
		69,23	5,12	—	—		
Vг	C ₁₆ H ₁₄ O ₆	63,68	4,78	—	—	91...93	70
		63,57	4,63	—	—		

* Характеристики соединений Па—г, з—к соответствуют ранее полученным [3, 4].

Ангидриды 4-фенил(фурил)-6-R-3,4-дигидро-2H-фуро[2,3-*b*]пиран-2,3-дикарбоновых кислот (Va—г). К 0,005 моль 5-алкил(арил)-3-арилиден-3H-фуран-2-она (Па—в,з) в бензоле добавляют 0,005 моль малеинового ангидрида. Реакционную смесь нагревают на водяной бане в течение 1 ч. Растворитель удаляют, кристаллы перекристаллизовывают из гексана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аветисян А. А., Дангян М. Т. // Успехи химии. — 1977. — Т. 46. — С. 1250.
2. Rao Y. S. // Chem. Rev. — 1964. — Vol. 64. — P. 353.
3. Аветисян А. А., Токманджян Г. Г. // ХГС. — 1987. — № 6. — С. 723.
4. Седавкина В. А., Морозова Н. А., Егорова А. Ю., Остроумов И. Г. // ХГС. — 1987. — № 4. — С. 451.
5. Потапов В. М. Стереохимия. — М.: Химия, 1988. — 464 с.

Саратовский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского,
Саратов 410600

Поступило в редакцию 28.01.97